

lecture "4"

Cerebral Cortex

- حيزي من lobes من الدماغ، والآخر هو وظيفة.
- Central sulcus و Parietal lobe و Frontal lobe
- Temporal lobe و Parietal lobe و Frontal lobe و lateral sulcus
- occipital lobe و Parietal lobe هو
- occipito - parietal sulcus
- major حيزاً من قشرة المخ، حيزاً من قشرة المخ، حيزاً من قشرة المخ.

1, 3, 4

- حيزي من قشرة المخ من lobes و وظيفة حيزي، كذا حيزي من قشرة المخ.
- Frontal lobe حيزي من قشرة المخ، حيزي من قشرة المخ، حيزي من قشرة المخ.
- motor area حيزي من قشرة المخ، حيزي من قشرة المخ، حيزي من قشرة المخ.
- behavior حيزي من قشرة المخ، حيزي من قشرة المخ، حيزي من قشرة المخ.
- Personality حيزي من قشرة المخ، حيزي من قشرة المخ، حيزي من قشرة المخ.
- sensation حيزي من قشرة المخ، حيزي من قشرة المخ، حيزي من قشرة المخ.
- Vision حيزي من قشرة المخ، حيزي من قشرة المخ، حيزي من قشرة المخ.
- auditory, memory حيزي من قشرة المخ، حيزي من قشرة المخ، حيزي من قشرة المخ.

II Frontal lobe :- "حيز 4"

- Frontal lobe حيزي من قشرة المخ، حيزي من قشرة المخ، حيزي من قشرة المخ.
- 1/ Primary motor area
- 2/ secondary " " (association)
- 3/ Frontal eye field. (occipital حيزي من قشرة المخ)
- 4/ pre frontal cortex (most anterior part)
- 5/ Broca's area. (Motor speech area)

1/ Primary motor area : (area 4)

- موجودة في الجزء الخلفي من الدماغ (Post. part) في precentral gyrus.
- مسؤولة عن الحركات الإرادية (voluntary movement) من الجانب المقابل (Contralateral side) من الجسم.
- حيزاً (Area) في القشرة المخية (Cortex) مسؤولة عن كل جزء من الجسم، وكلما كان الجزء من الجسم أكبر، كلما كانت المنطقة في القشرة أكبر.
- Motor Homunculus: تمثيل للجسم البشري في الدماغ، حيث كل جزء من الجسم له منطقة معينة في الدماغ.
- related to the function of the body part: أي أن المنطقة في الدماغ مرتبطة بوظيفة الجزء من الجسم.
- presented area: أي أن المنطقة في الدماغ تظهر كصورة معكوسة (inverted position) للجسم.
- fine movement: حركات دقيقة (fine movement) مرتبطة بالجزء من الجسم.
- Face: الوجه، والقدم (Foot) في الجزء الخلفي من الجسم.

↑ حيز 7

fibers من area 4 إلى premotor area، cerebellum، basal ganglia.

2/ Pre motor area : (area 6)

- مسؤولة عن الحركات الإرادية (voluntary movement) من الجانب المقابل (Contralateral side) من الجسم.
- memory: ذاكرة، أي أن المنطقة في الدماغ مسؤولة عن تخزين المعلومات.
- planning: التخطيط، أي أن المنطقة في الدماغ مسؤولة عن التخطيط للحركات.
- (premotor): أي أن المنطقة في الدماغ مسؤولة عن الحركات الإرادية.

- precentral gyrus: الجزء الخلفي من الدماغ (Post. part) في precentral gyrus.
- Electrical stimulation: التحفيز الكهربائي، أي أن التحفيز الكهربائي ينتج حركات مشابهة لتلك التي تنتجها المنطقة 4.
- stimulus: التحفيز، أي أن التحفيز ينتج حركات مشابهة لتلك التي تنتجها المنطقة 4.
- Primary: أي أن المنطقة في الدماغ مسؤولة عن الحركات الإرادية.

1- Premotor cortex (المخة الحركية) - input sensory cortex (المخة الحسية) and basal ganglia (المخيخ) and thalamus (المخيخ).

store programs of motor activity & planning of the motor movements.

لو كانت ال stimulus قوية جدًا فحصل ال premotor area ونصير ال movement ال bypassing ال Primary أو لو ما كانت قوية جدًا تمام ال Primary، بعض نصير كبريتة.

Premotor area $\leftarrow$ $\overline{\text{new}}$ $\rightarrow$ motor association area $\parallel \leftarrow$
 supplementary motor area $\downarrow$

• medial frontal gyrus & supplementary ...
 • (lateral, medial) paracentral sulcus
 sup., middle, inf. → 3 areas superior & inferior sulcus

. movement of contralateral limbs stimulation .
 . Stronger stimulation of limbs .
 permanent loss of supplementary motor area .
 . premotor , primary motor movement .

3/ Frontal eye field:- (area 6, 8 & 9) ✓

موجود في ال precentral gyrus في ال middle frontal gyrus
 ← متوحد في ال frontal eye field ال visual eye field
 ال frontal أنابري عمل scanning للفق. يعني بي انطلق على
 ال مكان stimulation متكون من voluntary
 ال اما ال visual لازم stimulus يعني مثلا أجا هو أو صرني أفضله
 أسوف


- Electrical stimulation of this region cause conjugate movements of the eye. (مضبوحة على ايد opposite side)
 لم لايه في crossing

4/ pre frontal cortex - "خبره سلايه 14"

frontal lobe ال most ant. part ال
 superior, middle & inferior frontal gyri ال
 orbital gyri ال
 higher cognitive functions ال, Executive function ال
 Prefrontal Cortex ال مسؤول عن
 النقطة الثالثة سلايه 14 - عين تقابل كانه وقاينه وان
 ليحرف في المحيط الي حوالي (منح لوفخرينه والعن) وان يقابل باستخلاق قبل
 م حلال في هذا ال cognition, awareness يتلو المنطقة حالي
 هي المسؤول عن

5/ Broca's area: (area 44 & 45)

motor speech area ال
 inferior frontal gyrus ال



"خبره سلايه 16"

Broca's area ال 98% is dominant ال
 (right handed persons ال). left side ال

- هي ان anatomy عادي موجودة بالجهة functional : أكثر على
ال left من 98% من الناس

- يعني لو حمار مستكة بال left side عند وصول الناس حيتا تروا بشكل
كبير لكه لو مستكة على ال right مارج يتأثروا .

لو يعني لو حمار مستكة بال left حيطا المريض قادر يكلم لانه motor
في speed of speech (يعني مسؤول عن muscles المنظمة
من ال speech)

بعض وصول الناس الى فاهيه يكلم لكه من قاربين يحلو عنه عني
مستكة بال dominant side ← Non fluent or motor aphasia .
هم لو تكانه صور رسة الي بال الفم الي قبل جا

2] Parietal lobe :-

- حركيا بشكل عام مسؤول عن ال somatic sensation زي ال
Proprioceptive sensation , temperature , pressure , Pain , touch
(يعني من ال tendons)

- غير انه مسؤول عن انه يستقبل وصول ال stimuli من ال area بره
في ال parietal lobe من دولة سال analysis بهم (understanding)
في عني 3 functional areas في ال parietal lobe :-

1/ Primary somatosensory area / cortex S1 :
(area 3, 1, 2)

- موجود في ال lateral surface of hemisphere postcentral gyrus
ويوجد بره في ال medial surface paracentral lobule
(Post part)

- اصل somatosensory أو somesthetic
يستقبل Projection fibers من ال thalamus في ال sensation
يتم بال thalamus لانه كدة Relay ، بعدا بتصلوا ال cortex .

- نفس المنطقة الـ sensation الـ opposite half of body
وبتلقا inverted نفس فقرة الـ motor homunculus، انزياح الـ area
بالجسم الـ sensory receptors كثرة معانة ان الـ presentation
تقر على الـ cortex بتلقا أكتوبه المناطق الـ بتلقا في الـ receptors
عنها مثل .

الـ الـ foot والـ face والـ genitals بتلقا الـ medial الـ الـ leg
بتلقا لفظه والـ tongue لكث .

- أغلب الـ sensations بتلقا contralateral لكث بعضم زي الـ oral region
مقتل الـ same side (ipsi) .

ويجبه المناطق زي الـ pharynx والـ larynx والـ perineum بتلقا على
الـ both sides .

- الـ primary sensory موجودة بالزبط على الـ anterior part
الـ post central gyrus ، حبيبت الـ fibers من muscle spindles
والـ tendon ، الـ joint receptors (الـ proprioceptive sensation) .

- حلت الـ sensory information بتلقا الـ primary sensory area
ويصط interpretation بالـ secondary sensory area ، بعدا
مخط الـ signals الـ motor activity يعني الـ sensory cortex
ح يصير الـ signals الـ motor cortex على تصير الـ motor activity .
↑ حمر - لايه 18, 22 .

2/ secondary somatosensory cortex S2 :
↳ (or association)

حمر - لايه 22 :
المنطقة الحسية الموجودة في الـ sup. lib of post. limb of lateral
sulcus .

- زي م انتو شافينه بالصوره وانها حسية كثر معانة بالـ primary

جانب horizontal فيبقى الجزء superior و anterior من
منه primary كانت لغزها وكتا

- ال Face يلم بال anterior part أما ال leg في ال posterior
 - الجسم حيا bilateral representation مع contralateral side dominant
 - ال details فيطري بال unknown . ولما شكل عام في
 - ال brain تحل تكشف انه شغلان موجودة وشغلان مش موجودة
 - حتى مؤخرًا بيحكوا انه ال anatomical structures بوضو على شغلان
 - تلو من موجودة .
- ال 23 قراءة .

(في يحكوا ال posterior)

3/ Somesthetic association area :

- نفس فكرة ال secondary motor ، ال association ال
- يعتبرها منطقة وحدة مكونة من 2 parts ← somatosensory
- ← somesthetic
- موجودة في ال superior parietal lobule وتكون extending على
- ال medial side لا hemisphere .

ال 24 قراءة .

مسئولة ان ال واحد يتو recognize ال objects placed in the hand
لله بيده م يكونه شغلان

لهمي لو ال parietal lobe مافيه مشكلة ، فطالوا اول مرة عكس
شغلان حوتخزيم بال sensory memory بعد ذلك حتى لو من شغلان و مجرد
م بدل touch وحين الشغلان حوتخزيم شغلان حتى لو من شغلان .

- لو حار مشكلة بكون منطقة حوتخزيم شغلان حوتخزيم شغلان
بين المرضي بسك الشغلان لكونا بيحوتخزيم ال لو شغلان .

3| Occipital lobe :

حوتخزيم ال 30

ال occipital lobe مسئول عن ال Vision .

بنقسم ال 2 functional areas :-

1/ primary visual cortex : (area 17)

حصة ال 26 :-

من ال Calcarine sulcus موجود في ال occipital lobe يتكون

من ال primary visual area ويتفرع lateral

ال primary visual area من ال

Walls of the posterior part of calcarine sulcus & extends around occipital pole into lateral surface of hemisphere.

حصة ال 27 :-

ال pathway ألياف القصب في ال crossing ال optic chiasm

بنقسم ال ال nasal side و temporal side

ارجعوا الى جزء د. حبل لوب القصب فافهم حصة من خريطة ال optic chiasm .

ال 28 قراءة :-

ال (Association

2/ secondary visual area : (area 18, 19)

ال primary ال ال visual stimuli

ال secondary ال ال ال ال stimuli ال ال understanding ال ال stimuli

ال 29 قراءة :-

→ occipital eye field :

حصة ال ال frontal ال ال ال stimuli

ال eye movement ال ال ال ال ال stimulus (نلاحظ مثلاً)

ال ال ال ال ال ال occipital eye field

ال ال secondary visual area

ال ال ال ال al side conjugate deviation of the eyes

ال ال ال ال ال stimuli

- لا علاقة بال superior colliculus .
- ينشأ باختصار ال occipital ال , frontal ال (eye fields) المنبثقة
- مسؤولة عن motor movement of extraocular muscles
- وحدة بسبب stimuli , وحدة لا .

41 Temporal lobe :-

32

بشكله 3 من ال

1/ Primary auditory cortex :- (area 41, 42)

- موجودة في ال gyrus of Heschl , في ال inferior wall

body

lateral sulcus

- تضم أيضا ال auditory pathway ال آخرتي , ال medial geniculate

يصل ال external capsule وتوحد بالقرن ال primary auditory area

نهاد ال input

- كما أنه ال tonographic mapping ال كما موجود في ال cochlea

ال ال cortex ف :-

1) ال anterior part ال reception of sounds of low frequency

ال auditory cortex

2) ال posterior part " " high frequency

- لو حصل unilateral lesion ال partial deafness

ال bilateral presentation ال ال بالتحليل قبل

34

منطقة كثر ال 41, 42 ال

2/ secondary auditory area : (area 22)

- ال auditory association area

- وتقبل ال interpretation ال ال sound signals ال ال primary

- موجودة في ال ال posterior ال ال primary auditory area

ال ال lateral sulcus , في ال superior temporal gyrus

into primary auditory area impulses
 (medial geniculate body) Thalamus
 area input more than 10%
 Wernicke's area

3/ Wernicke's area:

sensory speech area (Broca's area)
 left dominant hemisphere (98% of cases)
 superior temporal gyrus with extensions
 posterior end of the lateral sulcus into parietal region
 mainly temporal lobe
 34

Broca's area fibers
 arcuate fasciculus

understanding written & spoken language.

Wernicke's area
 "fluent aphasia"
 association

connection between
 somatic, visual & auditory

Other cortical areas :-

1/ Taste area :- (gustatory)

taste sensation

ant. $\frac{2}{3}$ of tongue $\rightarrow$ chorda tympani (from facial)

post $\frac{1}{3}$ " $\rightarrow$ glossopharyngeal nerve.

general sensation

1- taste area موجود ہے ال lower end ال postcentral gyrus

نی ال superior wall of the lateral sulcus ال insula

ال insula باقیہ استونہ الا اذا سللت ال lateral sulcus

ال ascending fibers ال nucleus solitarius

ال CN تلو mixed لکن ال nuclei مختلفہ من وجہ ال یعنی

تلو وجہ ال sensory وجہ ال motor

ال nucleus solitarius علاقہ ال sensory nucleus لاکثر nerves

(ال facial وال glossopharyngeal وال vagus) ال

ال fibers ال nucleus of the thalamus ال VPM ال

ال cortex ال neurons ال

ال nucleus solitarius من بس ال taste یعنی مشترک ال

ال pathway ال taste ال facial

ال glossopharyngeal

2/ Vestibular area :-

ال vestibular pathway ال ال ascending pathway

ال vestibular nuclei ال cerebral cortex ال

ال vestibular area (ال positioning movement ال head)

ال postcentral gyrus ال concerned with sensations

ال of the face

ال opposite ال auditory area ال superior temporal gyrus

ال areas ال ال

ال vestibular nerve ال ال connection ال

ال eye movement ال ال contralateral side

3/ Insula:

ال 40

حركية لobe مخفي ستوفه لوستن ال lateral sulcus
 - هو مهم و involved في articulatory movements ل speech
 لكن كذا ال connections بتوفه من معروفه لكن هو مهم ل speech
 مع ال Broca's و ال Wernicke's لكن كيف بيه inputs
 و بتطلع منه outputs من معروف .

هنا خلاصا تكاني مع ال main lobes
 - باسنة ال lesions طابولونا على ال cortex ارضي مستوى ال tracts
 لغاية ال ال anterior horn cells و ال upper motor و مع بتوفه في
 muscle spasticity و بانيه تقاعيل في حركات و رولا و حركات
 * لوحا ال CVA في ال prefrontal lobe و بتلا في ال behavior
 بتوفه و ال cognition

• cerebral dominance:-

- في Commissural fibers واطلة طابيه ال 2 hemispheres و في
 م بتوفه أغلب بتلا بتوفه presented و لكن بتوفه و صاير متلا في
 حركات complete loss ل function .
 - تقريرا ال 2 hemispheres في بعض (almost identical) (من 100٪ لكن بتلا
 بتوفه بعض) و في م حركات بتوفه في متلا dominance على ال 1 side .
 - الاية 41 قراءة

- ال fibers ال طلة مع ال Lt لا ال Rt تقريرا بتلا ال طلة مع ال Rt لا ال Lt
 - معظم الناس right-handed يعني ال presentation بتوفه ال Lt side ^{in brain} dominant
 و حركات ال speech بتوفه ال Lt dominant لكن مع ال activities في
 ال spatial perception ك يعني اقدر اقدر تقدر في ال left او ال right
 علايات ال (و اتي صاير بالفرنج) و هاي بتوفه متلا على ال dominant
 ال right-hemisphere (لبي اصل بتوفه عن ال dominance بتلا
 مع ال left hemisphere (الو هم 98٪ مع ال left)
 لكن في الناس العكس .

فقط طاي ال وظيفة

- يعني ال spatial perception (واله recognition of faces & music)
يتلوه ال interpretation الهم في ال hemisphere . nondominant .
يعني لو واحد right-handed ال يتلوه ال dominant ال
ال dominant ال هم في ال left brain لك بس بقصبة
ال spatial perception الهم في ال nondominant hemisphere
اللي عنده يعتبر ال right brain والعكس صحيح .

- **السبب - ال 42 قرادة** [أي ال مكتوب (قرادة) يعني ال مكتوب قرادة]

- في بعض الأحيان بتحكى إنه لغاية عمر ال 5 سنوات لما ما يتلوه محد يانه
هار ال طفل left dominant ولا right عنقه هيك الصغر لما عسكو اولهم
مثلا بلاقع عسكو بالهم في ال right ، لك بعد هيك حب ال Practi
و القوي بيتكول ال Rt او Lt .

- لك لو حمار خيال في ال adults فله ما بقدر أخول ال dominancy
ال Rt لا ال Lt أو بالعكس . (يعني بين لغاية 5 years of age)

لك كدر أساسي والي لها علاقة بال brain بتلوه موضع سنك وسؤال وتعلم
ما بقدر تخلي انهم 100٪ وظايفهم ثابتة واللا تعالى تعالى وتعلم .

وسكوه

تم التفرغ بحمد الله ...

صحة عذروني أمي أسكنها الله الفردوس الأعلى ...