

Which of these statements about the posterior triangle of the neck is false?

- ☐ a. The facial nerve can be injured during parotid gland surgery.
- ☒ b. External jugular vein runs some of its course in anterior triangle of neck.
- ☐ c. It contains the third part of the Subclavian artery but branches from first part.
- ☐ d. It is divided by inferior belly of omohyoid bone to occipital and subclavian triangles.
- ☐ e. Subclavian vein lies at a lower level than artery and superficial to Scalenous anterior.

Clear my choice





الوقت المتبقي 0:25:56

سؤال 27

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Regarding anterior triangle of the neck

- a ☐ The submandibular triangle is separated from carotid triangle by posterior belly of digastric
- b ☐ There is no direct connection between muscular and submandibular triangle
- c ☐ None of the above
- d ☐ All of the above
- e ☐ Superior belly of omohyoid separate muscular from carotid triangle

الصفحة التالية

تنقل الاختبار

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
	29	28	27	26	25	24	23	22	21
40	39	38	37	36	35	34	33	32	31



Regarding the cervical plexus one is true

- ☐ a. Phrenic nerve arises mainly from C3
- ☐ b. Branches from C3 –C4 to Sternomastoid muscle
- ☐ c. Great auricular nerve is one of its sensory branches
- ☐ d. Lies deep to trapezius muscle.
- ☐ e. Is formed by anterior primary rami of lower four cervical nerve

Next page

الوقت المتبقي 19

Regarding the muscles of the neck

- a ☐ .Sternomastoid and trapezius muscles are supplied by mixed cranial nerve number XI
- b ☐ .Suprahyoid Muscles include Genohyoid Mylohyoid, Stylohyoid and digastric muscles
- c ☐ .The sternocleidomastoid muscle main actions are rotation of the head to the opposite side and extension of the neck
- d ☐ .Digastric muscle posterior belly is supplied from a branch from posterior division of mandibular nerve
- e ☐ .Trapezius muscle has three parts each has different action, middle part protracts the scapula

الصفحة

الوقت

Regarding meningeal spaces and bleeding all are true except

- a. ☐ Extradural hemorrhage is arterial bleed
- b. ☐ Chronic subdural hemorrhage is more serious than acute one
- c. ☐ CT finding of subdural hemorrhage looks like a crescent
- d. ☐ Lucid interval occurs in extradural hemorrhage
- e. ☐ Extradural hemorrhage is due to middle meningeal artery bleed

سؤال 27

غير عجاب عليه
بعد

الدرجة من 1.00

٣ عليم هذا
السؤال

11:53 AM

6/24/2021

Posterior boundary of carotid triangle is

- a ☐ Trapezius muscle
- b ☐ Sternomastoid muscle
- c ☐ Stylohyoid
- d ☐ Superior belly of omohyoid
- e ☐ post belly of digastric

سؤال 29

غير محاب عليه
بعد

الدرجة من 1.00

٣ علم هذا
السؤال

11:55 AM

Acute subdural hemorrhage, one is false

- a. ☒ Cause increasing headache
- b. ☐ Due to injury to bridging veins
- c. ☐ Acute subdural bleed has high mortality rate 20%
- d. ☐ Divided into acute and chronic depending on rate of bleeding
- e. ☐ Blood collects between dura and arachnoid layers

أحلي اختياري

35

مجاب عليه

درجة من 1.00

علم هذا

سؤال

The subclavian vessels all are true except

- ☐ a. Each subclavian artery is divided by Scalenus Anterior muscle into three parts.
- ☐ b. The subclavian arteries supply only the upper limbs
- ☐ c. The subclavian vein is used by surgeon as a central line for feeding and IV access.
- ☐ d. The Subclavian vessels lies deep to carotid sheath.
- ☐ e. The subclavian vein pass in front of the Scalenus anterior and at a lower level than the artery.

Next page

الوقت المتبقي 0:15:08

Regarding posterior triangle of the neck all are true except

- a ☐ Vessels in the posterior triangle include first part of subclavian artery, and branches of third part of subclavian artery
- b ☐ Roof of posterior triangle include, superficial fascia, platysma muscle external J. V and cutaneous branches of cervical plexus investing layer of deep cervical fascia
- c ☐ Trunks and roots of brachial plexus lies in it
- d ☐ The spinal accessory nerve can be injured while dissecting near the floor of the triangle
- e ☐ The phrenic nerve and the sensory branches of cervical plexus lie in part in it

الصفحة التالية



ProBook 4

بيج والأجنة العام، د. الياس ارتين

الدراسية / الفصل الثاني 20_21 / الطب البشري / الطب البشري - قسم عام / علم التشريح والأجنة

Regarding Dural venous sinuses all are true except

- a. ☐ Draining skull bones, meninges, brain and pituitary gland, orbit, internal ear
- b. ☐ Spheno-parietal sinus run along lesser wing of sphenoid bone
- c. ☐ Are defined as Intracranial veins that run in a Dural fold
- d. ☐ Thin walled, valveless veins
- e. ☐ Inferior Sagittal sinus lies in pos 2/3 of superior border of falk cerebri

Mylohyoid muscle all are true except

- .Lies superficial to anterior belly of digastric muscle .a ☐
- .Can open the mouth .b ☐
- .Forms the floor of mouth .c ☐
- Its posterior fibers are inserted into hyoid bone .d ☐
- .Its nerve supply is a branch of inferior alveolar nerve .e ☐

The following structures pass through foramen ovale except

- a ☐ Middle meningeal artery
- b ☐ Lesser superficial petrosal nerve
- c ☐ Motor root of trigeminal nerve
- d ☐ Mandibular nerve
- e ☐ Emissary vein

سؤال 21

غير محاب عليه

بعد

الدرجة من 1.00

٣ علم هذا

السؤال

- Hemorrhages related to dura all are true except
- a. ☐ Acute subdural hemorrhage is less serious than chronic one
 - b. ☐ Extradural hemorrhage is bleeding from branches of first part of maxillary artery
 - c. ☐ Subdural chronic hemorrhage may pass early unnoticed
 - d. ☐ CT scan can differentiate between the two
 - e. ☐ Epidural hemorrhage may show a lucid interval

الصحة العامة

Regarding sternomastoid muscle

- a ☐ Excessive stretching during delivery leads to congenital torticollis
- b ☐ Contraction of one side muscle turns the face to same side
- c ☐ Origin from the back of manubrium
- d ☐ Is supplied only by cranial nerve XI
- e ☐ Both muscles acting together flexes head at atlanto-axial joint



التشريح والأجنة العام، د. الياس ارتين

تم / مقرراتي الدراسية / الفصل الثاني 21_20 / الطب البشري / الطب البشري - قسم عام / عام
Final General anatomy

Venous sinuses of brain

- Inferior petrosal sinus arises from anterior end of cavernous sinus .a ☐
- Trigeminal ganglia lie postero- lateral to cavernous sinus .b ☐
- Single venous sinuses include transverse sinus .c ☐
- Cavernous sinus lies in Lie in floor of posterior cranial fossa .d ☐
- Straight sinus continues as Rt transverse sinus .e ☒

أجل اختياري

عليه

1.03

لأ



الوقت المتبقي 0:13:33

سؤال 26

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Regarding innervation of skin of head and neck

- a ☐ Cervical plexus is the only sensory innervation of the neck
- b ☐ Lesser occipital nerve accompanies the external jugular vein
- c ☐ None of the above is true
- d ☐ Posterior part of neck is supplied by anterior Primaries of C2-C3
- e ☐ Angle of mandible is supplied by C3



الصفحة

تنقل الاختبار

Regarding cervical plexus

- a ☐ .Its sensory branches supply only front of the ear
- b ☐ .Cervical plexus branches are usually seen during anterior neck dissection
- c ☐ .Phrenic nerve is the most important muscular branch of cervical plexus arise mainly C3
- d ☐ .Its lesser occipital nerve is a sensory nerve which accompanies external jugular veins
- e ☐ .One of its motor nerves supply a muscle which shrug the shoulder

م. التشريح والأجنة العام، د. الياس ارتين

تحكم / مقرراتي الدراسية / الفصل الثاني، 20، 21 / الطب البشري / قسم عام / علم التشريح والأجنة العام، د. الياس ارتين

الوقت المتبقي

The subclavian vessels all are true except

- a. ☐ The subclavian arteries supply only the upper limbs
- b. ☐ The Subclavian vessels lies deep to carotid sheath
- c. ☐ The subclavian vein is used by surgeon as a central line for feeding and IV access
- d. ☐ Each subclavian artery is divided by Scalenus Anterior muscle into three parts
- e. ☐ The subclavian vein pass in front of the Scalenus anterior and at a lower level than the artery

25

أب عليه

1.00

م هذا

ر

الوقت المتبقي



BOY Sunny ENG 11:40 6/24



نوجه التحم / مقرراني الدراسية / الفصل الثاني 20-21

/ الطب البشري / الطب البشري - قسم عام

/ علم التشريح والأجنة العام، د. الياس ارتين

/ 20 يونيو - 26 يونيو / Final General anatomy exam

الوقت المتبقي 0:27:10

سؤال 20

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Regarding superficial veins of head and neck

- a. ☐ External jugular vein lies entirely deep .to investing layer of deep fascia
- b. ☐ Common facial vein is short wide vein .that ends in internal jugular vein
- c. ☐ External jugular vein ends in .brachiocephalic vein
- d. ☐ Maxillary vein ins in internal jugular vein
- e. ☐ Anterior jugular veins lie in carotid triangle

المسألة التالية

?Which of the following nerves does not share in cutaneous innervation behind ear

- Third occipital .a ☐
- auriculotemporal .b ☐
- Greater occipital .c ☐
- Lesser occipital .d ☐
- Great auricular .e ☐

سؤال 31

غير محبات عليه
بعد

الدرجة من 1.00

3 علم هذا
السؤال

11:51 AM

لتشريح والأجنة العام، د. الياس ارتين

م / مقرراتي الدراسية / الفصل الثاني 20_21 / الطب البشري / الطب البشري - قسم عام / علم التشريح

Regarding muscles of facial expression all are true except

- a. ☐ Arrange themselves around opening
- b. ☐ Located within superficial fascia
- c. ☐ No tendons
- d. ☐ Most of them are innervated by facial nerve (VII)
- e. ☐ Attached to bony area at one end & to the skin at the other

عليه

1.00

1.00

80°F Sunny ENG

Regarding superficial veins of head and neck

- a. ☐ External jugular vein lies entirely deep to investing layer of deep fascia
- b. ☐ Anterior jugular veins lie in carotid triangle
- c. ☐ External jugular vein ends in brachiocephalic vein
- d. ☐ Maxillary vein joins internal jugular vein
- e. ☐ Common facial vein is short wide vein that ends in internal jugular vein

سؤال 27

غير مجاب عليه
بعد

الدرجة من 1.00

3 عليم هذا
السؤال

شرح والأجنة العام، د. الياس ارتين

مقرراتي الدراسية / الفصل الثاني 20_21 / الطب البشري / الطب البشري - قسم عام / علم التشريح

Inferior sagittal sinus

- a. ☐ Contains valves unlike other Dural sinuses
- b. ☐ Drain to transverse sinus
- c. ☐ Is present in anterior 2/3 of lower border of falx cerebri
- d. ☐ Drain directly into confluence of sinuses
- e. ☐ Is formed between two layers of dura

80°F Sunny



سؤال 21

الوقت المتبقي 0:24:47

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

٣ علم هذا السؤال

Regarding the scalp

- a ☐ Deep stitches are needed to control bleeding from cut wounds as blood vessels run deep in the loose areolar layer of scalp
- b ☐ Facial artery does share in the arterial supply of the scalp
- c ☐ There are anastomosis between branches of external and internal carotid branches in scalp
- d ☐ Its veins are not connected to Dural sinuses of brain
- e ☐ Is rich in sebaceous glands in the 2nd layer of scalp

الصفحة التالية

تنقل الاختبار





/ علم التشريح والأجنة العام، د. الياس ارتين / 20 يوليو - 26 يوليو

/ Final General anatomy exam /

الوقت المتبقي 0:42:33

سؤال 12

غير محاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

A sharp blow to the side of head over temporal region can lead to rupture of which vessel

- a. Basilar artery ☐
- b. Cavernous sinus ☐
- c. Middle meningeal artery ☐
- d. Maxillary artery ☐
- e. Superficial temporal artery ☐

الصفحة التالية

تنقل الاختبار



لتشريح والأجنة العام، د. الياس ارتين

م / مقرراتي الدراسية / الفصل الثاني 20_21 / الطب البشري / الطب البشري - قسم عام / علم التشريح

Regarding muscles of facial expression all are true except

- a. Arrange themselves around opening ☐
- b. Located within superficial fascia ☐
- c. No tendons ☐
- d. Most of them are innervated by facial nerve (VII) ☐
- e. Attached to bony area at one end & to the skin at the other ☐

عليه

1.00

1.00

80°F Sunny ^ ENG

التشريح والأجنة العام، د. الياس ارتين

م / مقراني الدراسية / الفصل الثاني 21_20 / الطب البشري / الطب البشري - قسم عام / علم التشريح والأجنة العام د. الياس ارتين

الوقت: 10

The face

- None of the above: a ☐
- Dangerous area of the face include nose, part of ear: b ☐
- Muscles of facial expression are innervated by facial nerve except buccinator's muscle: c ☐
- Temporal branch of facial nerve supply all of orbicularis oculi muscle: d ☐
- Mandibular branch of facial nerve supply muscles of lower lip: e ☐

الد



80°F Sunny ENG

نريخ والأجنة العام، د. الياس ارتين

قرراتي الدراسية / الفصل الثاني 20_21 / الطب البشري / الطب البشري - قسم عام / علم

The largest structure passing through the cavernous sinus is the

- a. ☐ internal carotid artery
- b. ☐ trigeminal (mandibular division)
- c. ☐ internal jugular vein
- d. ☐ greater petrosal nerve
- e. ☐ Abducent nerve



80°F Sunny



الوقت المتبقي 0:43:59

سؤال 10

غير محاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Regarding cavernous sinus

- a. The mandibular division of the trigeminal nerve runs in its lateral wall ☐
- b. Internal carotid artery pass through it from anterior to posterior end ☐
- c. Maxillary division of V2 cranial nerve lies in floor of sinus ☐
- d. Trigeminal ganglia lies postero-medial to sinus ☐
- e. Abducent nerve passes through sinus medial to internal carotid artery ☐

الصفحة



تنقل الاختبار

9 8 7 6 5 4 3 2 1



يحي والأجنة العام، د. الياس ارتين

الدراسية / الفصل الثاني 20_21 / الطب البشري / الطب البشري - قسم عام / علم التشريح والأجنة العام

Which of the following statements about the anterior triangle of the neck is incorrect

- a. ☐ Contains the carotid sheath
- b. ☐ Contains the external jugular vein
- c. ☐ Is further divided by the digastric and omohyoid muscles
- d. ☐ Lies between the midline, the mandible and the anterior border of sternocleidomastoid
- e. ☐ Contains the Submandibular gland



80°F Sunny

الأجنة العام، د. الياس ارتين

دراسية / الفصل الثاني 20, 21 / الطب البشري / الطب البشري - قسم عام / علم التشريح والأجنة العام، د. الياس ارتين

الوقت المتبقي

?All of the following are found in the posterior triangle of the neck except one. Which one is the exception

- Subclavian artery .a ☐
- External jugular vein .b ☐
- Hypoglossal nerve .c ☐
- Phrenic nerve .d ☐
- Subclavian vein .e ☐

التصنيف



80% Sunny

يخ والأجنة العام، د. الياس ارتين

في الدراسة / الفصل الثاني 21,20 / الطب البشري / الطب البشري - قسم عام / علم التشريح والأجنة العام - د. الياس ارتين / 20 يونيو - 26 يونيو

الوقت المتبقي: 0:12:19

Regarding the scalp

- a. ☐ Facial artery share in the arterial supply of the scalp
- b. ☐ It is rich in sebaceous glands
- c. ☐ Deep stitches are needed to control bleeding from cut wounds as blood vessels run deep in the loose areolar layer of scalp
- d. ☐ Auriculo-temporal nerve does not share in the innervation of scalp
- e. ☐ Its veins are not connected to Dural sinuses of brain

الاجابة الصحيحة


بح والأجنة العام، د. الياس ارتين

الدراسة / الفصل الثاني 20_21 / الطب البشري / الطب البشري - قسم عام / علم التشريح والأجنة العام، د. الياس

الوقت

Regarding anterior triangle of the neck all are true except

- a. ☐ Submandibular triangle contains not all branches of external carotid artery
- b. ☐ Symphysis menti forms apex of submental triangle
- c. ☐ Carotid triangle is separated from submandibular triangle by posterior belly of digastric muscle
- d. ☐ Submandibular triangle is separated from muscular triangle by superior belly of omohyoid
- e. ☐ There is no direct border separating between submandibular and muscular triangle



80°F Sunny



الوقت المتبقي 0:36:47

سؤال 20

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Superior petrosal sinus has connection to

- a ☐ Sigmoid and superior sagittal sinus
- b ☐ Inferior petrosal and cavernous sinus
- c ☐ Cavernous sinus and transverse sinus
- d ☐ Superior sagittal and transverse sinuses
- e ☐ Cavernous sinus and internal jugular vein

الصفحة التالية

تنقل الاختبار

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
29	28	27	26	25	24	23	22	21	
40	39	38	37	36	35	34	33	32	31



نقل الاختبار

الوقت المتبقي 0:59:54

Regarding trapezius muscles

Removal tumor or lymph node from posterior triangle may paralyze the muscle .a ☐

All are correct .b ☐

The trapezius is a large paired surface muscle that extends longitudinally from the occipital bone to the lower .c ☐
thoracic vertebrae of the spine and laterally to the spine of the scapula

Upper fibers elevate the shoulder .d ☐

Is supplied by cranial nerve XI .e ☐

80°F Sunny

شرح والأجنة العام، د. الياس ارتين

مقرراتي الدراسية / الفصل الثاني 20_21 / الطب البشري / الطب البشري - قسم عام / علم التشريح و

Which statement concerning the muscles of the neck is true

- a. ☐ Stylohyoid is supplied by the glossopharyngeal nerve
- b. ☐ Mylohyoid is supplied by the facial nerve
- c. ☐ Sternothyroid lies superficial to Sternohyoid
- d. ☐ The tendon of omohyoid overlies the internal jugular vein
- e. ☐ The suprahyoid muscles are supplied by the ansa cervicalis



الوقت المتبقي 0:19:27

الدرجة من 1.00

٣ علم هذا السؤال

Regarding infra hyoid muscles

- The Jugulo-omohyoid lymph node is related to the intermediate tendon of omohyoid muscle superficial to sternomastoid muscle .a ☐
- In large goiter if need to be cut better done from below .b ☐
- On contraction they elevate hyoid bone .c ☐
- One of the infrahyoid muscles divide the posterior triangle into two triangles .d ☐
- Are arranged in two layers and all are supplied by ansa cervicalis except one muscle which is sternothyroid .e ☐

الصفحة التالية

تنقل الاختبار

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
	29	28	27	26	25	24	23	22	21
40	39	38	37	36	35	34	33	32	31





الوقت المتبقي 0:21:24

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

٣ علم هذا السؤال

Which statement concerning the muscles of the neck is true

- a ☐ Sternothyroid lies superficial to Sternohyoid
- b ☐ The tendon of omohyoid overlies the internal jugular vein
- c ☐ Stylohyoid is supplied by the glossopharyngeal nerve
- d ☐ The suprahyoid muscles are supplied by the ansa cervicalis
- e ☐ Mylohyoid is supplied by the facial nerve

الصفحة التالية

تنقل الاختبار

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
	29	28	27	26	25	24	23	22	21
40	39	38	37	36	35	34	33	32	31



الوقت المتبقي 0:23:19

سؤال 29

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Which of the following nerves does not share in
?cutaneous innervation behind ear

 .a ☐ auriculotemporal

 .b ☐ Lesser occipital

 .c ☐ Greater occipital

 .d ☐ Third occipital

 .e ☐ Great auricular

الصفحة التالية

تنقل الاختبار

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	19	18	17	16	15	14	13	12	11
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21
40	39	38	37	36	35	34	33	32	31





/ الطب البشرى / الطب البشرى - قسم عام

/ علم التشريح والأجنة العام، د. الياس ارتين

/ 20 يونيو - 26 يونيو / Final General anatomy exam

الوقت المتبقي 0:12:06

سؤال 29

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

٣ علم هذا السؤال

Deep cervical fascia of neck all are true except

- a. Investing layer split to enclose both trapezius and Sternomastoid muscles ☐
- b. Prevertebral fascia encloses XI nerve ☐
- c. Pretracheal fascia enclose infrahyoid muscles ☐
- d. Carotid sheath is part of it ☐
- e. Investing layer of fascia has no relation to parotid gland ☐

الصفحة التالية

تنقلا الاختبار



الوقت المتبقي 0:02:42

سؤال 36

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

٣ علم هذا السؤال

Regarding cavernous sinus on answer is false

- a. ☐ Trigeminal ganglia lie postero-lateral to sinus
- b. ☐ Ophthalmic division of V cranial nerve lies in lateral wall
- c. ☐ Is related laterally to pituitary gland
- d. ☐ Abducent nerve passes through sinus
- e. ☐ The ICA pass through sinus from posterior to anterior end



الصفحة التالية

تنقل الاختبار



الوقت المتبقي 0:01:50

سؤال 37

غير محاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

The pterion is an important landmark because it overlies the

- a. Anterior cerebral artery ☐
- b. Anterior branch of middle meningeal artery ☐
- c. Posterior branch of middle meningeal artery ☐
- d. Internal carotid artery ☐
- e. Superior sagittal sinus ☐



الصفحة

تنقل الاختبار

9 8 7 6 5 4 3 2 1



علم التشريح والأجنة العام، د. الياس ارتين / 20 يونيو - 26 يونيو

Final General anatomy exam /

الوقت المتبقي 0:19:21

سؤال 26

غير محاب عليه بعد

الدقة من 1.00

علم هذا السؤال

Regarding muscles of the neck

- a. ☐ Stylohyoid muscle is supplied by IX cranial nerve
- b. ☐ IVC lies deep to intermediate tendon of omohyoid muscle
- c. ☐ Sternohyoid muscle lies deep to sternothyroid muscle
- d. ☐ Suprahyoid neck muscles are supplied by ansa cervicalis
- e. ☐ Mylohyoid muscle is supplied from maxillary nerve V2



الصفحة التالية





الوقت المتبقي 0:49:29

سؤال 6

غير محاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Regarding infra hyoid muscles:

- a ☐ .On contraction they elevate hyoid bone
- b ☐ .Are arranged in two layers and all are supplied by ansa cervicalis except one muscle which is sternothyroid
- c ☐ .The Jugulo-omohyoid lymph node is related to the intermediate tendon of omohyoid muscle superficial to sternomastoid muscle
- d ☐ .One of the infrahyoid muscles divide the posterior triangle into two triangles
- e ☐ .In large goiter if need to be cut better done from below

الصفحة التالية

تنقل الاختبار



10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11



لوحة التحكم / مقرراتي الدراسية / الفصل الثاني 20_21

/ الطب البشري / الطب البشري - قسم عام

/ علم التشريح والأجنة العام، د. الياس ارتين / 20 يونيو - 26 يونيو

Final General anatomy exam /

الوقت المتبقي 0:54:15

سؤال 4

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

The superior root of the Ansa cervicalis is formed directly by a branch of the

- a. ☐ hypoglossal
- b. ☐ posterior primary ramus of C2
- c. ☐ anterior primary ramus of C1
- d. ☐ posterior primary ramus of C3
- e. ☐ none of the above

الصفحة التالية

تنقل الاختبار

/ علم التشريح والأجنة العام، د. الياس ارتين / 20 يونيو - 26 يونيو

Final General anatomy exam /

الوقت المتبقي 0:21:44

سؤال 24

غير محاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Posterior boundary of carotid triangle is

.a ☐ post belly of digastric

.b ☐ Trapezius muscle

.c ☐ Sternomastoid muscle

.d ☐ Stylohyoid

.e ☐ Superior belly of omohyoid

الصفحة التالية



تنقل الاختبار

