

الوقت المتبقي 0:23:11

سؤال 23

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Regarding the external intercostal muscle

- a. ☐ It takes origin from the inferior border of rib below
- b. ☐ Infront it is replaced by anterior intercostal membrane
- c. ☐ It is inserted in inferior border of rib above
- d. ☐ It extends posteriorly to angle of the rib
- e. ☐ Its fibers are directed downward and backwards

الصفحة التالية

تنقل الاختبار



10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11

Veins of anterior abdominal wall

- a. ☒ In portal hypertension the flow of bloods in veins around umbilicus is inwards
- b. ☐ Inferior vena caval obstruction the flow of veins above umbilicus is upwards
- c. ☐ Superficial veins above umbilicus drain to subclavian vein
- d. ☐ None of the above
- e. ☐ Superior epigastric vein is part of superficial venous system

سؤال 14

غير مجاب عليه
بعد

الدرجة من 1.00

٣ أيام هذا
السؤال



Final General anatomy exam / 20 يونيو - 26 يونيو /

الوقت المتبقي 0:48:00

سؤال 8

غير محاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Veins of anterior abdominal wall

- a. ☐ Superficial veins above umbilicus drain to subclavian vein
- b. ☐ Inferior vena caval obstruction the flow of veins above umbilicus is upwards
- c. ☐ Superior epigastric vein is part of superficial venous system
- d. ☐ None of the above
- e. ☐ In portal hypertension the flow of bloods in veins around umbilicus is inwards



الصفحة التالية

/ علم التشريح والأجنة العام، د. الياس ارتين / 20 يونيو - 26 يونيو

/ Final General anatomy exam /

الوقت المتبقي 0:21:44

سؤال 24

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Posterior boundary of carotid triangle is

a. ☐ post belly of digastric

b. ☐ Trapezius muscle

c. ☐ Sternomastoid muscle

d. ☐ Stylohyoid

e. ☐ Superior belly of omohyoid

الصفحة التالية



تنقل الاختبار

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11

الوقت المتبقي 0:49:31

سؤال 7

غير محاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

؟ غم هذا السؤال

While examining a patient with inguinal hernia the DR passed his finger down in superficial inguinal ring, he felt a bony protuberance which is

- a ☐ Pubic tubercle
- b ☐ None of the above
- c ☐ Pecten pubis
- d ☐ Pectineal line
- e ☐ Symphysis pubis

الصفحة التالية



تنقل الاختبار



الوقت المتبقي 0:59:54

سؤال 1

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Regarding the intercostal arteries all are true except

a. ☐ Bleeding from intercostal arteries is more severe than from intercostal veins

b. ☐ Not All the posterior intercostal arteries arise from descending thoracic aorta

c. ☐ The internal thoracic artery arises from subclavian artery and supply upper six anterior intercostal spaces

d. ☐ Upper nine intercostal spaces contain two anterior intercostal arteries

e. ☐ In the subcostal groove the intercostal artery runs above the accompanying vein



الصفحة التالية

تنقلا الاختبار

الوقت المتبقي 0:40:17

سؤال 12

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Regarding the muscles of the neck

a. ☐ Digastric muscle posterior belly is supplied from a branch from posterior division of mandibular nerve

b. ☐ The sternocleidomastoid muscle main actions are rotation of the head to the opposite side and extension of the neck

c. ☐ Suprahyoid Muscles include Genohyoid Mylohyoid, Stylohyoid and digastric muscles

d. ☐ Sternomastoid and trapezius muscles are supplied by mixed cranial nerve number XI

e. ☐ Trapezius muscle has three parts each has different action, middle part protracts the scapula



الطب البشري / الطب البشري - قسم عام

علم التشريح والأجنة العام، د. الياس ارتين / 20 يونيو - 26 يونيو

Final General anatomy exam /

الوقت المتبقي 0:30:52

سؤال 17

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Regarding the intercostal nerve

- a. ☐ None of the above is true
- b. ☐ It runs between internal and inner most intercostal muscles
- c. ☐ The subcostal nerve runs in the anterior abdominal wall
- d. ☐ 'It gives motor branches to pleura
- e. ☐ The fifth intercostal nerve has a thoraco-abdominal course



الصفحة التالية

تنقل الاختبار

الوقت المتبقي 0:17:13

سؤال 27

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Regarding muscles of the neck

- a. ☐ Sternohyoid muscle lies deep to sternothyroid muscle
- b. ☐ IVC lies deep to intermediate tendon of omohyoid muscle
- c. ☐ Mylohyoid muscle is supplied from maxillary nerve V2
- d. ☐ Suprahyoid neck muscles are supplied by Ansa cervicalis
- e. ☐ Sternothyroid muscle is supplied is retracted in thyroid surgery



الصفحة التالية

الوقت المتبقي 0:37:42

The anterior abdominal wall (ABW) and its blood and nerve supply

The ABW is supplied by lower five intercostal nerves only .a ☐

An abscess in the skin of abdominal wall above umbilicus drains into inguinal lymph nodes .b ☐

None of the above .c ☐

The superficial anterior abdominal wall veins above umbilicus drains normally upwards and below umbilicus .d ☐

.drains downwards

.The inferior epigastric artery lies lateral to deep inguinal ring .e ☐

الصفحة التالية

لوحة التحكم / مقرراتي الدراسية / الفصل الثاني 20_21

/ الطب البشري / الطب البشري - قسم عام

/ علم التشريح والأجنة العام، د. الياس ارتين / 20 يونيو - 26 يونيو

/ Final General anatomy exam /

الوقت المتبقي 0:54:15

سؤال 4

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

The superior root of the Ansa cervicalis is formed directly by a branch of the

- ☐ a. hypoglossal
- ☐ b. posterior primary ramus of C2
- ☐ c. anterior primary ramus of C1
- ☐ d. posterior primary ramus of C3
- ☐ e. none of the above

الصفحة التالية

تنقل الاختبار

الوقت المتبقي 0:30:52

سؤال 17

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Regarding the intercostal nerve

- a. ☐ None of the above is true
- b. ☐ It runs between internal and inner most intercostal muscles
- c. ☐ The subcostal nerve runs in the anterior abdominal wall
- d. ☐ 'It gives motor branches to pleura
- e. ☐ The fifth intercostal nerve has a thoraco-abdominal course



الصفحة التالية

تنقل الاختبار



الوقت المتبقي 0:29:41

سؤال 18

غير محاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

٣ علم هذا السؤال

A medical student was asked by supervising consultant to identify the sternal angle the sternal angle is a landmark for locating the level of

- Jugular notch .a ☐
- .Disc between T3-T4 .b ☐
- Costal margin .c ☐
- Sternoclavicular joint .d ☐
- 2nd costal cartilage .e ☐

الصفحة التالية

تنقل الاختبار



/ علم التشريح والأجنة العام، د. الياس ارتين / 20 يونيو - 26 يونيو

/ Final General anatomy exam /

الوقت المتبقي 0:19:21

سؤال 26

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Regarding muscles of the neck

- a. ☐ Stylohyoid muscle is supplied by IX cranial nerve
- b. ☐ IVC lies deep to intermediate tendon of omohyoid muscle
- c. ☐ Sternohyoid muscle lies deep to sternothyroid muscle
- d. ☐ Suprahyoid neck muscles are supplied by ansa cervicalis
- e. ☐ Mylohyoid muscle is supplied from maxillary nerve V2



الصفحة التالية

الوقت المتبقي 0:46:10

سؤال 8

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

👍 علم هذا السؤال

In the root of the neck the subclavian artery and subclavian vein are separated by the

- ☐ a. Anterior scalene muscle
- ☐ b. trunks of the brachial plexus
- ☐ c. none of the above
- ☐ d. all the above
- ☐ e. middle scalene muscle

الصفحة التالية

تنقل الاختبار

⬆️	9	8	7	6	5	4	3	2	1
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21



علم التشريح والأجنة العام، د. الياس ارتين / 20 يونيو - 26 يونيو

Final General anatomy exam /

الوقت المتبقي 0:32:23

سؤال 16

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Regarding anterior triangle of the neck

- a. ☐ All of the above
- b. ☐ The submandibular triangle is separated from carotid triangle by posterior belly of digastric
- c. ☐ There is no direct connection between muscular and submandibular triangle
- d. ☐ Superior belly of omohyoid separate muscular from carotid triangle
- e. ☐ None of the above



الصفحة التالية

تنقل الاختبار

/ الطب البشري / الطب البشري - قسم عام

/ علم التشريح والأجنة العام، د. الياس ارتين / 20 يونيو - 26 يونيو

/ Final General anatomy exam /

الوقت المتبقي 0:41:52

سؤال 11

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Regarding cavernous sinus

- a. ☐ Maxillary division of V2 cranial nerve lies in floor of sinus
- b. ☐ The mandibular division of the trigeminal nerve runs in its lateral wall
- c. ☐ Abducent nerve passes through sinus medial to internal carotid artery
- d. ☐ Internal carotid artery pass through it .from anterior to posterior end
- e. ☐ Trigeminal ganglia lies postero-medial to sinus



الصفحة التالية

Final General anatomy exam /

الوقت المتبقي 0:34:05

سؤال 15

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Regarding innervation of skin of head and neck

- a. ☐ Cervical plexus is the only sensory innervation of the neck
- b. ☐ None of the above is true
- c. ☐ Posterior part of neck is supplied by anterior Primii rami of C2-C3
- d. ☐ Angle of mandible is supplied by C3
- e. ☐ Lesser occipital nerve accompanies the external jugular vein

الصفحة 10



تنقل الاختبار



الوقت المتبقي 0:45:23

سؤال 9

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Regarding sternomastoid muscle

- ☐ a. All of the above are true
- ☐ b. Arise by two heads from sternum and clavicle
- ☐ c. Internal jugular vein can be exposed .between two heads of the muscle
- ☐ d. Excessive stretching during delivery .leads to congenital torticollis
- ☐ e. Right muscle can be made to contract by pushing the chin to left side

الصفحة التالية

تنقل الاختبار



9	8	7	6	5	4	3	2	1
20	19	18	17	16	15	14	13	12
30	29	28	27	26	25	24	23	22

الوقت المتبقي 0:45:23

سؤال 9

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Regarding sternomastoid muscle

- ☐ a. All of the above are true
- ☐ b. Arise by two heads from sternum and clavicle
- ☐ c. Internal jugular vein can be exposed .between two heads of the muscle
- ☐ d. Excessive stretching during delivery .leads to congenital torticollis
- ☐ e. Right muscle can be made to contract by pushing the chin to left side

الصفحة التالية

تنقل الاختبار



9	8	7	6	5	4	3	2	1
20	19	18	17	16	15	14	13	12
30	29	28	27	26	25	24	23	22

الوقت المتبقي 0:18:24

سؤال 24

غير محاب عليه بعد

الدرجة من 20

٣ نعلم هذا السؤال

Which statement best completes this sentence the **inguinal canal**

- a. ☐ Has the internal oblique as part of its posterior wall throughout
- b. ☐ Has the conjoint tendon superiorly
- c. ☐ Is bounded posteriorly by the inguinal ligament
- d. ☐ Has a deep ring, which is a defect in the transversus abdominis muscle
- e. ☐ Transmits the ilioinguinal nerve, which enters the canal through the deep ring

Final General anatomy exam /

الوقت المتبقي 0:58:06

سؤال 2

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

The inguinal canal all are true except

- a. ☐ Has external oblique aponeurosis along the whole length of the anterior wall
- b. ☐ Has its deep ring half an inch above the midpoint of the inguinal ligament
- c. ☐ Is about 1.5 cm long
- d. ☐ Has fascia transversalis along the whole length of the posterior wall
- e. ☐ Has the inferior epigastric artery medial to its deep ring



الصفحة

تنقل الاختبار

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

الوقت المتبقي

سؤال 28

غير محاسب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

The anterior abdominal wall (ABW) and its blood and nerve supply

- a ☐ The superficial anterior abdominal wall veins above umbilicus drains normally upwards and below umbilicus drains downwards
- b ☐ The inferior epigastric artery lies lateral to deep inguinal ring
- c ☐ None of the above
- d ☐ An abscess in the skin of abdominal wall above umbilicus drains into inguinal lymph nodes
- e ☐ The ABW is supplied by lower five intercostal nerves only



الصفحة التالية



الوقت المتبقي 0:41:44

سؤال 11

غير محاب فيه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

The pterion is an important landmark because it overlies the

- a. ☐ Anterior branch of middle meningeal artery
- b. ☐ Superior sagittal sinus
- c. ☐ Internal carotid artery
- d. ☐ Anterior cerebral artery
- e. ☐ Posterior branch of middle meningeal artery

الوقت المتبقي 48

سؤال 1

غير محبات عليه 100

الدرجة من 1.00

تم هذا السؤال

Regarding intercostal nerves all are true except

- a ☐ The lateral cutaneous nerve of the 2nd intercostal nerve is called the intercostobrachial nerve
- b ☐ In the intercostal groove the nerve lies below the vessels
- c ☐ The typical intercostal nerve runs part of its course in the chest wall
- d ☐ The lower five intercostal nerves supply the anterior abdominal wall
- e ☐ The first intercostal nerve has no cutaneous branch

الصفحة التالية



نقل الاختبار





Final General anatomy exam /

الوقت المتبقي 0:37:45

سؤال 13

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Deep cervical fascia of neck all are true except

- a. ☐ Investing layer split to enclose both trapezius and Sternomastoid muscles
- b. ☐ Investing layer of fascia has no relation to parotid gland
- c. ☐ Pretracheal fascia enclose infrahyoid muscles
- d. ☐ Carotid sheath is part of it
- e. ☐ Prevertebral fascia encloses XI nerve



الصفحة

تنقل الاختبار



شرح والأجنة العام، د. الياس ارتين

مقارناتى الدراسة / الفصل الثاني 20_21 / الطب البشرى / الطب البشرى - قسم عام / علم التشريح والأجنة العام، د. الياس ارتين / 20 يونيو - 26

الوقت المتبقي 0:52:09

A 55-year-old man was admitted for inguinal hernia repair the surgeon during surgery the hernia sac was above and lateral to inferior epigastric artery the hernia was diagnosed as

- a. ☐ None of the above
- b. ☐ Indirect inguinal hernia
- c. ☐ Direct inguinal hernia
- d. ☐ Incisional hernia
- e. ☐ Femoral hernia



شرح والأجنة العام، د. الياس ارتين

مقارناتى الدراسة / الفصل الثاني 20_21 / الطب البشرى / الطب البشرى - قسم عام / علم التشريح والأجنة العام، د. الياس ارتين / 20 يونيو - 26

الوقت المتبقي 0:52:09

A 55-year-old man was admitted for inguinal hernia repair the surgeon during surgery the hernia sac was above and lateral to inferior epigastric artery the hernia was diagnosed as

- a. ☐ None of the above
- b. ☐ Indirect inguinal hernia
- c. ☐ Direct inguinal hernia
- d. ☐ Incisional hernia
- e. ☐ Femoral hernia



الوقت المتبقي 0:52:03

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Regarding abdominal wall muscles

- a. ☐ The lacunar lig is a backward extension .of conjoint tendon
- b. ☐ Internal oblique arises from lower 3-4 .ribs
- c. ☐ Inferior rounded border of the inguinal ligament is attached the superficial .fascia of the thigh, the fascia lata
- d. ☐ The superficial ring is a triangular opening in external oblique above and lateral to pubic tubercle
- e. ☐ Lacunar ligament forms the medial .boundary of the femoral ring

الصفحة التالية

تنقل الاختبار

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
19	18	17	16	15	14	13	12	11	
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21
40	39	38	37	36	35	34	33	32	31

Regarding surface anatomy of chest wall all are true except

- a. ☐ Midaxillary line passes in apex of axilla
- b. ☐ Angle of Lewis lies opposite 2nd costal cartilage
- c. ☐ Anterior axillary line passes along anterior border of pectoralis major muscle
- d. ☐ Scapular lines pass along superior and inferior angle of scapula
- e. ☐ Posterior axillary line passes along posterior border of latissimus dorsi muscle

سؤال 1

غير مجاب عليه
بعد

الدرجة من 1.00

٢ علم هذا
السؤال



80°F Sunny



ENG

9:00 AM

6/24/2021

الوقت

?Which of these statements about the posterior triangle of the neck is false

- a ☐ .The spinal accessory nerve can be injured during neck dissection surgery
- b ☐ .External jugular vein runs some of its course in anterior triangle of neck
- c ☐ .It is divided by inferior belly of omohyoid bone to occipital and subclavian triangles
- d ☐ .It contains branches of the first part of the Subclavian artery
- e ☐ .Subclavian vein lies at a lower level than artery and superficial to Scalenus anterior

سؤال 4

غير محاب عليه
بعد

الدرجة من 1.00

3 عام هذا
السؤال



الوقت المتبقي 0 57:20

سؤال 2

غير محاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Regarding cervical rib all are true except

- a ☐ Tingling & Numbness Partial paralysis on Ulnar side of forearm and hand
- b ☐ Present in 10% of people
- c ☐ Extra rib arise from C7 vertebra, causes pressure on structures which lie on upper surface of first rib
- d ☐ Causes pressure on Nerves & Arteries supplying the upper limb
- e ☐ can be bony or ligamentous structure

الصفحة

تنقل الاختبار

الوقت المتبقي 0:37:48

سؤال 13

غير محاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

؟ علم هذا السؤال

Which statement concerning the azygos
?system is incorrect

- a ☐ The hemiazygos and accessory
hemiazygos veins drain into the
azygos vein
- b ☐ Azygos vein lie on Lt side of
descending thoracic aorta
- c ☐ The posterior intercostal veins are
tributaries of the hemiazygos vein
- d ☐ The azygos vein passes through the
diaphragm with the aorta
- e ☐ The azygos vein end in superior vena
- cava



الصفحة التالية

تنقل الاختبار

علم التشريح والاجنة العام، د. الياس ارتين

مقرراتي الدراسية / الفصل الثاني 20_21 / الطب البشري / الطب البشري - قسم عام / علم التشريح والأجنة ال

Divercation of recti all are true except

- a ☐ Stretching of rectus sheath can lead to it
- b ☐ Occur if there is increase in intra-abdominal pressure
- c ☐ Usually occur in women after child birth
- d ☐ Is usually treated surgically
- e ☐ Ascites is an important cause

2

محتاج عليه

هوية من 1.00

أعلم هذا

السؤال



/ الطب البشرى / الطب البشرى - قسم عام

/ علم التشريح والأجنة العام، د. الياس ارتين / 20 يونيو - 26 يونيو

/ Final General anatomy exam /

الوقت المتبقي 0:20:35

سؤال 25

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Inguinal canal all are true except

- a. ☐ Roof is formed by internal oblique and transverses muscle
- b. ☐ Deep inguinal ring lies $\frac{1}{2}$ an inch above midpoint of inguinal ligament
- c. ☐ Newborn child, the deep ring lies almost directly posterior to the superficial ring
- d. ☐ Fascia transversalis form posterior wall of inguinal canal
- e. ☐ Anterior wall of canal is formed partly by internal oblique muscle on its medial part

الوقت المتبقي 0:47:35

سؤال 7

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

٣ علم هذا السؤال

The rectus abdominis muscle all are true except

- a. ☐ Is inserted into 7th,8th 9th costal cartilage and xiphoid process
- b. ☐ Its tendentious intersection is strongly attached to posterior wall of rectus sheath
- c. ☐ when contracted it extends the trunk and stabilize pelvis
- d. ☐ Arise from the front of symphysis pubis and pubic crest
- e. ☐ Is supplied by ilioinguinal nerve

الصفحة التالية

تنقل الاختبار



10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11

الوقت المتبقي 0:52:45

سؤال 6

غير محاسب علامة 1.00

الدرجة من 1.00

اعلم هذا السؤال

Inguinal canal

- a. ☐ Posterior boundary is formed by external oblique muscle
- b. ☐ Anterior boundary is formed conjoint tendon
- c. ☐ In Pediatric the deep ring lies posterior to superficial ring
- d. ☐ Is an oblique passage in lower abdominal wall below and parallel to Inguinal Lig
- e. ☐ Direct inguinal hernia pass through deep ring



الصفحة

تنقل الاختبار

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Final General anatomy exam /

الوقت المتبقي 0:26:15

سؤال 21

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Which statement about the oblique abdominal
?muscles is incorrect

- a ☐ The lower fibers of internal oblique form
.the inguinal ligament
- b ☐ Internal oblique arises from the lumbar
.fascia
- c ☐ The external oblique arises from the
.lower eight ribs
- d ☐ The internal oblique has a free lower
border
- e ☐ The fibers of external oblique pass
.antero-inferiorly



الصفحة التالية

تنقلا الاختبار

Final General anatomy exam /

الوقت المتبقي 0:26:15

سؤال 21

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Which statement about the oblique abdominal
?muscles is incorrect

- a. ☐ The lower fibers of internal oblique form
.the inguinal ligament
- b. ☐ Internal oblique arises from the lumbar
.fascia
- c. ☐ The external oblique arises from the
.lower eight ribs
- d. ☐ The internal oblique has a free lower
border
- e. ☐ The fibers of external oblique pass
.antero-inferiorly



الصفحة التالية

تنقلا الاختبار

الوقت المتبقي 0:29:13

سؤال 18

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Regarding cervical rib all are true except

a. ☐ can be bony or ligamentous structure

b. ☐ Tingling & Numbness Partial paralysis on Ulnar side of forearm and hand

c. ☐ Present in 10% of people

d. ☐ Extra rib arise from C7 vertebra, causes pressure on structures which lie on upper surface of first rib

e. ☐ Causes pressure on Nerves & Arteries supplying the upper limb



الصفحة

تنقل الاختبار

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1



الياس ارتين

لوحة التحكم / مقرراتي الدراسية / الفصل الثاني 20_21

/ الطب البشري / الطب البشري - قسم عام

/ علم التشريح والأجنة العام، د. الياس ارتين / 20 يونيو - 26 يونيو

Final General anatomy exam /

الوقت المتبقي 0:27:58

سؤال 19

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Paired venous sinuses include all except

a. Straight sinus ☐

b. Sigmoid sinus ☐

c. Superior petrosal sinus ☐

d. Cavernous sinus ☐

e. Transverse sinus ☐

الصفحة التالية

تنقل الاختبار

الوقت المتبقي 0:56:29

A young Dr is about to perform her first thoracocentesis the supervising consultant where would you ask her to insert the aspiration needle to avoid injury lung or neuro-vascular elements

- a ☐ The bottom of intercostal space 8 in mid clavicular line
- b ☐ The top of intercostal space 8 in mid clavicular line
- c ☐ The top of intercostal space 9 in midaxillary line
- d ☐ The top of interspace 11 in scapular line
- e ☐ The bottom of intercostal space 9 in midaxillary line

الصفحة التالية





الوقت المتبقي 0:49:29

سؤال 6

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Regarding infra hyoid muscles

.a ☐ On contraction they elevate hyoid bone

.b ☐ Are arranged in two layers and all are supplied by ansa cervicalis except one muscle which is sternothyroid

.c ☐ The Jugulo-omohyoid lymph node is related to the intermediate tendon of omohyoid muscle superficial to sternomastoid muscle

.d ☐ One of the infrahyoid muscles divide the posterior triangle into two triangles

.e ☐ In large goiter if need to be cut better done from below

الصفحة التالية

تنقل الاختبار



10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11

الوقت المتبقي 0:35:35

سؤال 14

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Regarding the conjoint tendon

- a. ☐ Lies posterior to lower part of rectus sheath
- b. ☐ Is innervated by ilioinguinal nerve
- c. ☐ It is attached to pubic crest and medial half of inguinal canal
- d. ☐ It lies in the medial half of posterior wall of inguinal canal
- e. ☐ Formed by fused lower fibers of internal oblique and transversus abdominis muscle

الصفحة 10



تنقل الاختبار



الوقت المتبقي 0 30 36

سؤال 17

غير محاسب عليه بعد

الدرجة من 1.00

لم يتم هذا السؤال

Regarding surface anatomy of chest wall all are true except

- a ☐ Midaxillary line passes in apex of axilla
- b ☐ Scapular lines pass along superior and inferior angle of scapula
- c ☐ Posterior axillary line passes along posterior border of latissimus dorsi muscle
- d ☐ Angle of Lewis lies opposite 2nd costal cartilage
- e ☐ Anterior axillary line passes along anterior border of pectoralis major muscle

الصفحة التالية

تنقل الاختبار

الوقت المتبقي 0:12:40

سؤال 30

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

The nerve which passes through superficial inguinal ring is

- ☐ .a Femoral nerve
- ☐ .b All of the above
- ☐ .c Iliohypogastric nerve
- ☐ .d Ilioinguinal nerve
- ☐ .e Lateral cutaneous nerve of thigh

الصفحة التالية

تنقل الاختبار

⬆️	9	8	7	6	5	4	3	2	1
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21

الوقت المتبقي 0:42:30

سؤال 10

غير محاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

٢٠ علم في سؤال

The following structures pass through foramen ovale except

- a ☐ Lesser superficial petrosal nerve
- b ☐ Mandibular nerve
- c ☐ Middle meningeal artery
- d ☐ Emissary vein
- e ☐ Motor root of trigeminal nerve

الصفحة التالية

تنقل الاختبار



الوقت المتبقي 0 24.13

سؤال 20

غير محاب عليه بعد

المرحلة من 1.00

علم هذا السؤال

Rectus sheath hematoma all are true except

- a. ☐ More common in left side
- b. ☐ Cause of hematoma is usually venous or arterial bleed
- c. ☐ May mimic acute appendicitis symptoms
- d. ☐ Usually below umbilicus
- e. ☐ More common in females

الصفحة التالية

تنقل الاختبار



علم التشريح والأجنة العام، د. الياس ارتين / 20 يونيو - 26 يونيو
Final General anatomy exam /

الوقت المتبقي 0:44:21

سؤال 10

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Regarding inguinal canal and inguinal hernia, one is false

a. ☐ Bilateral hernia is commoner in direct .hernia

b. ☐ Indirect hernia complication is .commoner

c. ☐ The posterior wall is strong where there .is a defect in anterior wall

d. ☐ The sac in direct hernia is congenital in .origin

e. ☐ The ilioinguinal nerve in the canal is .sensory nerve only



الصفحة التالية

الوقت المتبقي 0:13:44

سؤال 29

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Which of these statements about the posterior triangle of the neck is false

- a ☐ The facial nerve can be injured during parotid gland surgery
- b ☐ External jugular vein runs some of its course in anterior triangle of neck
- c ☐ It is divided by inferior belly of omohyoid bone to occipital and subclavian triangles
- d ☐ Subclavian vein lies at a lower level than artery and superficial to Scalenous anterior
- e ☐ It contains the third part of the Subclavian artery but branches from first part



الصفحة التالية

الوقت المتبقي 0 24.13

سؤال 20

غير محاب عليه بعد

المرحلة من 1.00

علم هذا السؤال

Rectus sheath hematoma all are true except

- a. ☐ More common in left side
- b. ☐ Cause of hematoma is usually venous or arterial bleed
- c. ☐ May mimic acute appendicitis symptoms
- d. ☐ Usually below umbilicus
- e. ☐ More common in females

الصفحة التالية

تنقل الاختبار





الوقت المتبقي 0:21:48

سؤال 22

غير محاب علم بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Inguinal canal all are true except

- a ☐ Newborn child, the deep ring lies almost directly posterior to the superficial ring
- b ☐ Anterior wall of canal is formed partly by internal oblique muscle on its medial part
- c ☐ Deep inguinal ring, an oval opening in the fascia transversalis, lies about (1.3 cm) above the inguinal ligament midway between the anterior superior iliac spine and the pubic tubercle
- d ☐ Fascia transversalis form posterior wall of inguinal canal
- e ☐ It transmits the ilioinguinal nerve in females



سؤال 10

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

٣ علم هذا السؤال

Regarding **inguinal canal** and inguinal hernia, one is false

a ☐ Bilateral hernia is commoner in direct .hernia

b ☐ Indirect hernia complication is .commoner

c ☐ The posterior wall is strong where there .is a defect in anterior wall

d ☐ The sac in direct hernia is congenital in .origin

e ☐ The ilioinguinal nerve in the canal is .sensory nerve only



الوقت المتبقي 0:13:33

سؤال 26

شعر محاب عليه بعد

الدرجة من 1.00

علم هذا السؤال

Regarding innervation of skin of head and neck

- a ☐ Cervical plexus is the only sensory innervation of the neck
- b ☐ Lesser occipital nerve accompanies the external jugular vein
- c ☐ None of the above is true
- d ☐ Posterior part of neck is supplied by anterior Primii rami of C2-C3
- e ☐ Angle of mandible is supplied by C3



الصفحة

تنقل الاختبار